

ବିଭିନ୍ନ (ବିବିଧ) ଉଷ୍ମ ଓ ଉଷ୍ମଫଳାଫଳ



Máté András – Fazekas Imre
OLT V., 2019.

BEVEZETÉS

Tényleg szegényebb az Alföld üvegszárnyú lepke faunája?

Az Alföld szitkár faunája (is) alul kutatott;

A 2000. óta gyűjtött adatok főként nem darázslepke specialistáktól származnak.

ADATGYŰJTÉS IDŐSZAKA ÉS MÓDSZEREI

2003-2019. évek között

A technológiai fejlődés jelentősége (digitális fényképezés, okofonok, GPS)

A gyűjtött adatokat jellemzően vegetációtérképezés, biotikai adatgyűjtés, cönológiai felvételezés közben rögzítették, illetve három faj esetében direkt adatgyűjtés történt;

A „könnyű” - sokszor terepi - határozás lehetőségét biztosító kiadvány (Fazekas Imre (2017): Magyarország Sesiidae faunája, Pannon Intézet

EREDMÉNYEK I.

18 faj adata, amelyek közül 3 fajnak nem volt az Alföldről korábbi adata

Fajlista:

Sesia apiformis

Paranthrene tabaniformis

Synanthedon stomoxiformis

Synanthedon myopaeformis

Synanthedon tipuliformis

Synanthedon loranthi

Bembecia ichneumoniformis

Pyropteron affine

Pyropteron muscaeformis

Chamaesphecia doleriffromis

Chamaespecia annellata

Chamaespecia palustris

Chamaesphecia crassicornis

Chamaespecia hungarica

Chamaespecia empiformis

Chamaespecia astatiformis

Chamaespecia masariformis

Chamaespecia bibioniformis

ÉREDMÉNYEK II.

Synanthedon loranthe; Pécs,
Mecsekoldal, európai sárgafagyöngy
(*Loranthus europaeus*)



8



Pyropteron affine; Kiskunhalas, tázlári
nyílt homokgyep homoki naprózsával
(*Fumana procumbens*)






9



Chamaesphecia doleriformis; Kiskőrös,
Szücsi-erdő tisztás, mezei zsályával
(*Salvia pratensis*)



10




EREDMÉNYEK III.

Chamaesphecia palustris;
Tatárszentgyörgy, Ordító-turján, mocsári
kutyatejjel(*Euphorbia palustris*)




11



Chamaesphecia crassicornis;
Tatárszentgyörgy, Rekettyés, virággazdag
rétsztyepökoton




12



Chamaesphecia hungarica (imágó és
hernyó); Kunpeszér, Alsópeszéri-rétek,
fényeskutyatejjel (*Euphorbia lucida*)




13




EREDMÉNYEK IV.

Pyropteron muscaeformis; Hortobágy, rétsztyepp típusú löszgyepben, ahol tömeges a varfű (*Knautia arvensis*)



Chamaespica masariformis;

Bugac, Tatárszentgyörgy, zavarástűrő fajokban gazdag homokpusztagyepben





Oberea euphorbiae

Chamaespecia hungarica



*Chamaespecia
doleriformis*



*Chamaespecia
crassicornis*



Pyropteron affine

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

